## ZWEI NEUE CRYPTOCEPHALUS AUS AFRIKA

(Col. Chrysom.)

(41. Beitrag zur Kenntnis der Chrysomeliden.)

VON

## CHARLES S. PAPP

In meinem 40. Beitrag (im Druck bei M. Villiers, Algier) erwähnten Material aus Nigeria, aus der Umgebung von Loko, in der Provinz Munschi, am Ufergebiet des Flusses Benne, erhielt ich zwischen anderem noch 17 Cryptocephalus-Arten. Damals konnte ich mich wegen Fehlens neuester Literatur mit diesen Arten nicht näher beschäftigen '.


## Cryptocephalus ogbonahsoni n. sp. (Fig. 1)

Durch seine breite Gestalt mit den fünf metallblauen Querbinden an den roten Flügeldecken und durch sein bräunlichgrünes Halsschild leicht zu erkennen.

Kopf metallisch bläulich-grün, Fühler schwarz, ersterer glänzend. Halsschild gross, vorn stark abgerundet, hinten mässig breit. einfarbig glänzend bläulich-grün und sehr fein punktiert. Flügeldecken kurz, an der Schulter am breitesten hier stumpf abgerundet, glänzend, rot, mit fünf unregelmässigen blauen Querbinden; Spitze schwarz; im Grund unregelmässig und fein

Für die literarische Unterstützung bin ich den Herren N. D. Riley und G. E. Bryant (British Museum, Natural History) zu grossem Dank verpflichtet.

punktiert. Hinten abgerundet, gleich hinter der Mitte eingeschnürt und verhältnismässig kurz. Die Beine sind schwarz, mit schwachem blauen Schimmer. Unten einfarbig schwarz mit



leichtem dunkelblauem Schimmer, mässig glänzend. Epipleuren glatt, Abdomen fein und unregelmässig punktiert.

Grösse: 6.5-7 mm.

Fundort: Nigeria, Loko (1 Expl., leg. K. J. Ogbonahson).

## Cryptocephalus azuromarginatus n. sp.

Glänzend, Kopf und Halsschild einfarbig schwarz, die nigropunctatus Papp ähnlich punktierten zitronengelben Flügeldecken mit schmalem, erzgrünen Rand. Die Beine sind schwarz.

Kopf tief eingezogen, schwarz, sehr fein punktiert. Fühler schwarz mit schwarzem grauem Überflug, dadurch fast matt erscheinend. Halsschild einfarbig schwarz, stark glänzend und unregelmässig fein punktiert. Flügeldecken zitronengelb, Schulter stark abgerundet, auffallend glänzend. Punktiert, die 1., 5. und 6. Punktreihe kürzer als die 2., 3., 4. und 7. (von der Naht gerech-

net). Am Rand herum von Schulter bis Schulter mit auffallend erzgrüner Randung, die nicht unterbrochen ist. Die Beine sind schwarz wie die ganze Unterseite.

Grösse: 5.25-5.5 mm.

Fundort: Nigeria, Loko (2 Expl. leg. K. J. Ogbonahson).

C. atricinctus Jac. aus Natal und C. atrolineatus Bryant aus Tanganyika sehr ähnlich. Bei atrolineatus Bryant an den braunen Flügeldecken mit 3 schwarzen Längsbinden (1-1 am Rand und eine an der Naht) und der schwarze Seitenrand vor der abgestumpften Spitze unterbrochen, auch das bräunliche Halsschild hat 2, mit der Seite parallel laufende, vorne beutelförmig verbreitete, abgerundete, schwarze Längsbinden.

